

Imunizacije za bebe

Vodič za roditelje

Ovo su vakcine koje su potrebne vašoj bebi!

Na rođenju ^{1,2}	Hep B	RSV-mAb ¹ 0–7 mjeseci
2 mjeseca ^{1,2}	Hep B 1–2 mjeseca ²	+ DTaP + PCV + Hib + Polio + RV
4 mjeseca ^{1,2}	Hep B ³	+ DTaP + PCV + Hib + Polio + RV
6 mjeseci ^{1,2}	Hep B 6–18 mjeseci ²	+ DTaP + PCV + Hib ⁴ + Polio 6–18 mjeseci ² + RV ⁵ + Grip ⁶ + COVID ⁷
12 mjeseci i stariji ^{1,2}	MMR 12–15 mjeseci ²	+ DTaP 15–18 mjeseci ² + PCV 12–15 mjeseci ² + Hib 6–18 mjeseci ² + Vodene kozice 12–15 mjeseci ² + Hep A ⁸ 12–23 mjeseci ² + Grip ⁶

Provjerite sa svojim ljekarom ili medicinskom sestrom da li vaša beba prima sve vakcine u skladu sa ovim rasporedom. Mnogo puta se vakcine kombinuju da bi se smanjio broj injekcija. Obavezno zatražite karticu sa datumima vakcinacije vaše bebe; nosite ovo sa sobom na svaku posjetu.

Evo liste bolesti od kojih će vaša beba biti zaštićena:

HepB: hepatitis B, ozbiljno oboljenje jetre

DTaP: difterija, tetanus (čeljust) i hri pavac (veliki kašalj)

PCV: pneumokokna konjugirana vakcina koja štiti od ozbiljne infekcije krvi, pluća i mozga

Hib: *Haemophilus influenzae* tip b, ozbiljna infekcija mozga, grla i krvi

Polio: dječja paraliza, teška paralizirajuća bolest

RSV: respiratori sincicijski virus, ozbiljna infekcija pluća

RV: rotavirusna infekcija, ozbiljna bolest dijareje

Grip: ozbiljna infekcija pluća

MMR: boginje, zaušnjaci i rubeola

COVID-19: ozbiljna i visoko zarazna bolest

HepA: hepatitis A, ozbiljno oboljenje jetre

Vodene kozice: također se naziva varičela

Napomene za gornji grafikon:

- Od oktobra do marta, novorođenčadi uzrasta od rođenja do 7 mjeseci možda će trebati RSV preventivna antitijela (RSV-mAb) ako RSV vakcina nije primljena tokom trudnoće. Određenoj starijoj novorođenčadi uzrasta od 8 do 19 mjeseci može biti potrebno RSV-mAb tokom njihove druge sezone RSV-a.
- Ovo je starosna granica u kojoj se ova vakcina treba primiti.
- Vašoj bebi možda neće trebati doza vakcine protiv Hep B u dobi od 4 mjeseca, u zavisnosti od vakcine koja se koristi. Provjerite sa svojim ljekarom ili medicinskom sestrom.
- Vaša beba možda neće trebati dozu Hib vakcine u dobi od 6 mjeseci, ovisno o vakcini koja se koristi. Provjerite sa svojim ljekarom ili medicinskom sestrom.
- Vašoj bebi možda neće trebati doza RV vakcine u dobi od 6 mjeseci, u zavisnosti od vakcine koja se koristi. Provjerite sa svojim ljekarom ili medicinskom sestrom.
- Sva djeca uzrasta od 6 meseci i starija treba da se vakcinišu protiv gripa u jesen ili zimu svake godine.
- Vašem djetetu će biti potrebne 2 ili 3 doze, u zavisnosti od marke vakcine protiv COVID-19 koja se daje.
- Vašem djetetu će biti potrebne 2 doze vakcine protiv Hep A, u razmaku od najmanje 6 mjeseci.

Bosnian translation provided by Fargo Cass Public Health



www.immunize.org/catg.d/p4010-bos.pdf

"Immunizations for Babies"

Item #P4010-bos Bosnian (12/8/2023)



Scan for PDF